1. G. Feinberg, Phys. Rev. 110, 1482 (1958); F. J. Ernst, Phys. Rev. Letters 5, 478 (1960).

2. N. Cabibbo and R. Gatto, Phys. Rev. 116, 1334 (1959); T. D. Lee (private communication); B. L. Joffe, Proceedings of the 1960 Annual International Conference on High-Energy Physics at Rochester (Interscience Publishers, Inc., New York, 1960).

3. K. Nishijima, Phys. Rev. 108, 907 (1957); J. Schwinger, Ann. Phys. 2, 407 (1957); S. Bludman, Nuovo cimento 9, 433 (1958).

4. The assignment given here of the additive quantum number is conventional. A linear combination of this quantum number with lepton number would give another conserved quantum number whose physical implications are the same.

5. The assignment of muon parity +1 to baryons, pions, etc., follows from the existence of nonleptonic transitions among such particles, and is unique up to factors $(-1)^{\text{baryon number}}$ or $(-1)^{\text{charge}}$ which have no physical significance.

6. See, e.g., C. N. Yang and J. Tiomno, Phys. Rev. 79, 495 (1950). The properties of multiplicative conservation laws are discussed by G. Feinberg and S. Weinberg, Nuovo cimento 14, 5711 (1959).

7. G. Feinberg, P.K.Kabir, and S. Weinberg, Phys. Rev. Letters 3, 527 (1959).

8. N. Cabibbo and R. Gatto, Phys. Rev. Letters 5, 114 (1960).

9. B. Pontecorvo, Zhur. Eksp. i Teoret. Fiz. 33, 549 (1957) (translation: Soviet Phys. -JETP 6(33), 429 (1958)).